



по применению  
кормовой добавки  
**Астравит™**

## I. Общие сведения

1. Астравит™ (Astravit) - кормовая добавка для повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.
2. Астравит™ содержит в 1000 г в качестве действующих веществ: полисахариды астрагала – 500 г, витамин В1 – 2 г, витамин В2 – 2,5 г, витамин С – 80 г, ксилоолигосахариды – 50 г, а также вспомогательное вещество – крахмал водорастворимый - до 1000 г.  
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
3. По внешнему виду представляет собой порошок от желтоватого до желто-коричневого цвета, растворимый в воде.
4. Астравит™ выпускают расфасованным по 100 г, 1 кг и 5 кг в полиэтиленовые фольгированные пакеты и по 20 кг в полимерные двухслойные мешки.
5. Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, даты изготовления, массы нетто, номера партии, информации о подтверждении соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных». Каждая упаковка снабжается инструкцией по применению.  
Хранят в плотно закрытой упаковке производителя в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 30°С.
6. Срок хранения – 36 месяцев со дня изготовления.
7. Астравит™ запрещается использовать по истечении срока хранения.

## II. Биологические свойства

8. Биологические свойства Астравит™ обусловлены комплексом входящих в его состав биологически активных веществ и обеспечивают повышение иммунитета животных, в том числе птиц, снижают воздействие стресса и неблагоприятных факторов внешней среды.  
Полисахариды астрагала способствуют активации специфических и неспецифических факторов иммунитета. Витамины группы В и витамин С оптимизируют процессы метаболизма в организме, обладают антистрессовыми свойствами. Ксилоолигосахариды стимулируют рост и развитие полезной микрофлоры кишечника.  
Применение Астравит™ сельскохозяйственным животным, в том числе птицам, снижает вероятность заболеваний, повышает устойчивость к стрессу и сохранность молодняка.

## III. Порядок применения

9. Кормовую добавку Астравит™ применяют для повышения естественной резистентности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, их сохранности и продуктивности при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды и стрессах.
10. Кормовую добавку вводят с водой для поения и выпаивают групповым или индивидуальным способом или вводят в корма на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств с использованием существующих технологий смешивания.

**Рекомендуемые нормы ввода:**

-птице с водой для поения: 100-200 г/ 1000 л воды: с кормом -200-300 г/т корма;  
-свиньям, крупному и мелкому рогатому скоту с водой для поения: 100-150 г/ 1000 л воды; с кормом 100-200 г/т корма или из расчета 0,5 г/10 кг массы животного.

**Длительность курса применения 3-5 дней.**

11. Астравит™ совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.
12. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказания не установлены.
13. Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

#### **IV. Меры личной профилактики.**

14. При работе с Астравит™ следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.
15. Астравит™ следует хранить в местах, недоступных для детей.
16. Организация-разработчик: ALPOVET LTD, Кипр.  
Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.