



I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Цекинал™ 25 (Sekinal 25).
Международное непатентованное наименование: цефкином.
2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций.
Цекинал™ 25 в 1 мл в качестве действующего вещества содержит: цефкином (в форме сульфата) - 25 мг/мл и вспомогательное вещество этилолеат – до 1 мл.
3. По внешнему виду Цекинал™ 25 представляет собой суспензию от белого до светло-коричневого цвета. При хранении возможно образование осадка, исчезающего при взбалтывании.
Срок годности Цекинал™ 25 при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона - 28 суток. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.
4. Цекинал™ 25 выпускают расфасованным по 20, 50, 100 и 250 мл в стеклянных или полимерных флаконах соответствующей вместимости, герметично закупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы помещают в индивидуальные картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.
6. Цекинал™ 25 следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Цекинал™ 25 отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: антибактериальный препарат группы цефалоспоринов четвертого поколения. АТСvet код: QJ01DE90.
10. Цефкинома сульфат, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumonia*, *Enterobacter spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Citrobacter spp.*, *Pasterella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Serratia marcescens*, *Histophilus sommi*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Basillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Bacterioides spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Prevotella spp.* и *Erysipelothrix rhusiopathiae*, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу.

Механизм действия антибиотика заключается в ингибировании синтеза клеточной стенки бактерии. Цефкином обладает высокой степенью проникновения в клетки и устойчивостью к воздействию β-лактамаз. В отличие от цефалоспоринов предыдущих поколений, цефкином не гидролизуется хромосомными β-лактамазами типа Amp-C или плазмидными цефалоспориноазами некоторых видов энтеробактерий.

После парентерального введения лекарственного препарата цефкином поступает в системный кровоток, достигая максимальной концентрации в сыворотке крови у крупного рогатого скота через 60-90 минут, у свиней – через 15-60 минут и сохраняется на

терапевтическом уровне в течение 24 часов. Цефкином связывается с белками сыворотки крови менее чем 5%, выводится из организма в неизменном виде с мочой. Период полувыведения у крупного рогатого скота – 2-2,5 часа, у свиней – 9 часов.

Цекинал™ 25 по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Цекинал™ 25 применяют с лечебной целью крупному рогатому скоту при респираторных заболеваниях, вызванных *Pasterella multocida* и *Pasterella haemolitica*, межпальцевом дерматите, некробактериозе, остром мастите, в том числе вызванном *Escherichia coli*, и колибактериозе телят; свиньям – при респираторных заболеваниях, вызванных *Pasterella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis*, синдроме ММА (мастит-метрит-агалактия), менингите, вызванном *Streptococcus suis*, артрите, дерматите и других инфекциях бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к цефкиному микроорганизмами.
12. Противопоказанием к применению Цекинал™ 25 является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата и другим β-лактамным антибиотикам.
13. Цекинал™ 25 применяют животным один раз в сутки глубоко внутримышечно в течение 2-5 дней по следующей схеме:

Вид животного	Показания	Суточная доза цефкинома / Цекинал™ 25	Схема применения
Крупный рогатый скот	Респираторные болезни, острый межпальцевый некробактериоз, дерматит бактериальной этиологии в области пальцев	1 мг цефкинома на 1 кг массы животного / 2 мл препарата на 50 кг массы животного	1 раз в сутки в течение 3-5 дней
	Острый мастит, осложненный септицемией	1 мг цефкинома на 1 кг массы животного / 2 мл препарата на 50 кг массы животного	1 раз в сутки в течение 2 дней
	Колибактериоз телят	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного / 4 мл препарата на 50 кг массы животного	1 раз в сутки в течение 3-5 дней
Свиньи	Респираторные болезни	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного / 2 мл препарата на 25 кг массы животного	1 раз в сутки в течение 3 дней
	Синдром ММА	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного / 2 мл препарата на 25 кг массы животного	1 раз в сутки в течение 2 дней
	Менингит, артрит, дерматит	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного / 2 мл препарата на 25 кг массы животного	1 раз в сутки в течение 5 дней

Перед каждым применением флакон с лекарственным препаратом следует тщательно встряхнуть. Для предотвращения местной реакции в процессе лечения животного рекомендуется производить инъекции в разные участки тела.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, воспалительная реакция на месте введения.
15. Особенности действия при первом введении препарата и при его отмене не установлено.
16. Препарат может быть использован для лечения самок в период беременности и лактации.
17. Следует избегать пропусков введения очередной дозы Цекинал™ 25, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее, далее интервал между введениями препарата не изменяется.
18. Побочных явлений и осложнений при применении Цекинал™ 25 в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У некоторых животных в месте инъекций возможно проявление локальной реакции в виде отека, который самопроизвольно рассасывается в течение 10-15 суток. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.
19. Цекинал™ 25 не следует применять одновременно с препаратами бактериостатического действия, в связи со снижением его бактерицидной активности.
20. Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток, свиней - не ранее, чем через 4 суток после последнего применения Цекинал™ 25. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко дойных коров в период лечения и последующие 3 суток после последнего применения Цекинал™ 25 запрещается использовать для пищевых целей. Такое молоко может быть использовано после термической обработки в корм животным.

IV. Меры личной профилактики.

21. При работе с Цекинал™ 25 необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.
22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Цекинал™ 25.
23. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
24. Организация-разработчик: ALPOVET LTD, Кипр.
Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.