



по применению
лекарственного препарата
Тилмал™ 250

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Тилмал™ 250 (Tilmal 250).
2. В 1 мл препарата содержится: 250 мг тилмикозина, 0,042 мл фосфорной кислоты и вода для инъекций до 1 мл.
3. Препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до коричневого цвета.
4. Препарат выпускают в полиэтиленовых флаконах по 1000 мл с навинчиваемыми крышками.
5. Препарат Тилмал™ 250 хранят по списку Б в заводской упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от +5 °С до +25 °С.
Срок годности препарата при указанных условиях хранения - 3 года со дня изготовления. Содержимое флакона необходимо использовать в течение 1 месяца после вскрытия упаковки.

II. Фармакологические свойства

6. Тилмикозин - полусинтетический антибиотик группы макролидных антибиотиков с широким спектром действия, активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Clostridium spp.*, *Arcanobacterium spp.* (*Corynebacterium*), *Brachyspira Hlyodysenteriae*, *Chlamydia spp.*, *Spirocll eta spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mannheimia Haemolitic* и *Mycoplasma spp.*
Механизм бактериостатического действия тилмикозина заключается в блокировании белкового синтеза в микробной клетке на рибосомальном уровне.
7. Кроме выраженного антибактериального действия ветеринарный препарат Тилмал™ 250 обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным эффектами. Препарат при пероральном введении хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани организма, через 1,5-3 часа достигает максимального уровня в сыворотке крови; терапевтические концентрации антибиотика сохраняются в организме в течение 18-24 часов.
Ветеринарный препарат Тилмал™ 250 выводится из организма в основном в неизменном виде, главным образом с желчью и частично с мочой.
8. Лечебный раствор в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и местнораздражающего действия.

III. Порядок применения

9. Ветеринарный препарат Тилмал™ 250 назначают с лечебной целью:
 - свиньям при респираторных заболеваниях -микоплазмозах, пастереллезе;
 - телятам при инфекционных заболеваниях органов дыхания: микоплазмозах, пастереллезе;
 - птицам при инфекциях дыхательной системы, вызванных микоплазмами и пастереллой.Препарат также применяется при смешанных инфекциях, вторичных инфекциях на фоне вирусных заболеваний и других инфекционных болезнях животных и птиц, возбудители которых чувствительны к тилмикозину.

10. Ветеринарный препарат Тилмал™ 250 применяют животным и птице с водой для поения в течение 3 - 5 дней подряд:

птице - групповым способом в суточной дозе 3 мл на 10 л воды (15-20 мг тилмикозина фосфата на 1 кг массы птицы);

свиньям - индивидуально или групповым способом 8 мл на 10 л воды (15-20 мг тилмикозина фосфата на 1 кг массы тела животного);

телятам - индивидуально с водой для поения два раза в день по 0,5 мл на 10 кг массы тела животного (6,25 мг тилмикозина фосфата на 1 кг массы тела животного).

Лечебный раствор в период лечения цыплят и поросят должен являться единственным источником питьевой воды, который готовят ежедневно (срок хранения не более 24 часов).

11. Побочных явлений и осложнений у птиц и животных при применении ветеринарного препарата Тилмал™ 250 в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к макролидным антибиотикам и появлении побочных явлений и осложнений применение препарата прекращают. Побочные явления исчезают самостоятельно, без дополнительной терапии, в течение 3 дней.
12. Не допускается применение ветеринарного препарат Тилмал™ 250:
- взрослым жвачным животным с развитым рубцовым пищеварением;
 - животным с выраженными нарушениями функции печени и (или) почек;
 - одновременно, а также в течение 7 дней до и 7 дней после применения ионофорных кокцидиостатиков и антибиотиков аминогликозидного ряда, так как у животных возможно появление побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффекты);
 - одновременно с ветеринарными препаратами и кормовыми добавками, содержащими бентонит.
13. Препарат запрещен к применению птицам, чье яйцо используется в пищу людям.
14. Убой свиней и птицы на мясо разрешается через 16 суток, телят - через 42 суток после последнего применения ветеринарного препарата.
В случае вынужденного убоя ранее установленного срока, мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

IV. Меры личной профилактики.

15. Работники и ветеринарные специалисты при использовании ветеринарного препарата Тилмал™ 250 должны соблюдать общие санитарно-гигиенические правила работы и техники безопасности.
16. При попадании ветеринарного препарата на кожу или слизистые оболочки его следует сразу смыть обильным количеством воды.
17. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.
Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией.
При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.
18. Организация-разработчик: ALPOVET LTD, Кипр.
Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.